




Cuidado de tu **acceso vascular**

PICC | Midline | Catéter implantable

Información clave para un **manejo seguro**, en casa y en la clínica.



¿Qué es un acceso vascular?

Un acceso vascular (Catéter central de inserción periférica - PICO, Midline o catéter implantable) es un dispositivo que permite **administrar medicamentos** y tratamientos de forma segura.

Su cuidado adecuado es clave para prevenir complicaciones y asegurar que el tratamiento funcione correctamente.

Cuentas con un **equipo de salud capacitado** para acompañarte y brindarte una **atención segura** en todo momento.



¿Qué es cada dispositivo?

PICC

Acceso venoso que se inserta en el brazo y llega hasta una **vena de gran calibre** (vena cava superior).

Midline (línea media)

Acceso venoso que se ubica en el brazo hasta **venas de mediano calibre** (axilar o subclavia).

Catéter implantable

Dispositivo médico con una **cámara** debajo de la piel, conectada a un catéter que permite la **administración de medicamentos**.

Cuidados Generales

Mantener tu catéter **limpio, seco y protegido** es clave para evitar infecciones.

- No tocar ni manipular el catéter
- Mantener el apósito limpio, seco y bien adherido
- No mojar durante el baño
- La manipulación debe ser únicamente por personal de salud
- Evitar desconexiones innecesarias
- Tener cuidado en traslados para evitar retiro del catéter

Cuidados en casa

Higiene y protección

- Mantener siempre el catéter limpio y seco
- Cubrir el área al momento del baño para evitar humedad
- No aplicar cremas ni lociones sin indicación médica
- Evitar rascar o lastimar la zona

Manejo y seguimiento

- Asistir puntualmente a las curaciones programadas (cada 7 días o según indicación)
- La manipulación debe ser realizada solo por personal de enfermería entrenado
- Desinfección del conector antes de administrar medicamentos
- Lavado con solución salina antes y después de cada administración

Recomendaciones importantes

- No permitir la toma de presión en el brazo donde está el catéter
- Evitar piscina, mar o inmersión en agua
- No dormir boca abajo
- Evitar movimientos bruscos o cargar objetos pesados
- Evitar deportes de contacto

Cuidados especiales **catéter implantable**

- No aplicar cremas o lociones sobre el dispositivo.
- No sumergir la zona en agua hasta que cicatrice completamente.
- Puede ducharse después de 24 horas, manteniendo la zona limpia y seca.
- Llevar siempre identificación del dispositivo.
- Realizar mantenimiento cada 3 meses si no está en uso.

La manipulación de este catéter es **exclusiva de personal especializado y autorizado** por su médico tratante.

Signos de alerta

Consulta **de inmediato** si presentas:

- Fiebre (38°C o más).
- Dolor o inflamación en el brazo.
- Enrojecimiento o calor en la zona.
- Presencia de secreción sanguínea o blanquecina en el sitio de inserción.
- Desplazamiento o salida del catéter.
- Desprendimiento del apósito.
- Dificultad o limitación del movimiento.



Tu **cuidado** hace parte de tu **tratamiento**.

¡Estamos contigo en cada paso!

COL-I-DC-885 Manejo de catéter Picc, Midline
y/o catéter implantable para pacientes
hospitalizados y pacientes en casa.

Transformando la salud

